



موارد نیازمند هماهنگی با اورژانس ۱۱۵

مادران پرخطر در دوره بارداری با علائم زیر

- ❖ اختلال هوشیاری
- ❖ ضربه مستقیم به شکم و لگن
- ❖ تشنج
- ❖ لمس توده نبض دار در واژن
- ❖ شوک: نبض تند و ضعیف ۱۱۰ بار در دقیقه یا بیشتر به همراه فشار ماکزیمم (بالایی) کمتر از ۹۰ میلی متر جیوه
- ❖ خونریزی و درد شکمی
- ❖ تنگی نفس و طپش قلب همراه افزایش تعداد تنفس و ضربان قلب، بیقراری، درد قفسه
- ❖ سینه، کبودی اندامها، ورم اندام تحتانی
- ❖ شک به لخته وریدهای عمقی پا: ورم و درد یک طرفه ران یا ساق، سردی و کبودی اندام، کاهش نبض اندامها
- ❖ علائم مسمومیت حاملگی: سردرد، تهوع و استفراغ شدید، فشارخون بالا (می نیمم مساوی یا بالاتر از ۱۱۰)، دفع پروتئین در ادرار ++ یا بیشتر، ورم دست و پا، افزایش وزن سریع، تاری دید
- ❖ اختلال روانی شدید که منجر به پرخاشگری و تحریک پذیری شدید شود.

مادران پرخطر در دوره پس از زایمان با علائم زیر

- ❖ تشنج
- ❖ شوک (طبق تعریف بالا)
- ❖ اختلال هوشیاری
- ❖ تنفس مشکل