

علائم خطر نوزاد

- ❖ کاهش سطح هوشیاری
- ❖ زردی 24 ساعت اول
- ❖ توكشیده شدن قفسه سینه
- ❖ ناله كردن
- ❖ رنگ پریدگی شدید
- ❖ كبودی لبها و مخاطات (سیانوز مرکزی)
- ❖ استفراغ مكرر شیر یا استفراغ صفراوی
- ❖ قرمزی اطراف چشم
- ❖ تحرک کمتر از معمول ، بی حالی و خواب آلودگی
- ❖ تشنج
- ❖ اسهال (دفع مدفوع آبکی با حجم زیاد بیش از 8 بار در روز)
- ❖ برآمدگی ملاج
- ❖ بی قراری و تحریک پذیری
- ❖ ترشحات چرکی ناف ، قرمزی اطراف ناف و یا خونریزی از ناف
- ❖ قرمزی ، گرمی و تورم پستان
- ❖ خوب شیر نخوردن
- ❖ عدم دفع مدفوع در 48 ساعت اول
- ❖ عدم دفع ادرار در 24 ساعت اول
- ❖ وجود جوشهای چرکی منتشر در پوست
- ❖ تب (درجه حرارت بیشتر از 37 درجه سانتی گراد)
- ❖ سرد شدن اندامها و بدن (درجه حرارت کمتر از 36 درجه)
- ❖ خروج ترشحات چرکی از چشم و تورم پلكها